



PROTOCOLOS CORPORAIS

Com a **única linha**
de preenchedores
desenvolvida para
uso corporal



MEDICAL

BIOINSTRUMENTS

LL BODY CONTOUR TECHNIQUE



Antes



Depois



Dra. Luciana Lourenço



Antes



Depois



Dra. Luciana Lourenço



Botão Anestésico



Aplicação em Tecido Subcutâneo Médio



Cânula 18x70
Aplicar na região centro superior



8mm da superfície em Leque
1ml/braçode leque
1,5ml/braço de leque

Sessões
Intervalo quinzenal
10mL por lado

Sofiderm
Derm Sub-Skin

20mL na sessão

Sessões
Intervalo quinzenal
15mL por lado

Sofiderm
Derm Sub-Skin

30mL na sessão

HIPS DIPS MARCAÇÃO 2


Antes



Depois



Dra. Luciana Lourenço




SQUARE TECHNIQUE I

Antes



Depois



Dra. Luciana Lourenço

Botão Anestésico

Aplicação em Tecido Subcutâneo Médio

Cânula 18x70 Subcisão não traumática

2,5ml de HA Aeskins Sub-Skin
Por leque: 4 leques 10ml em cada lado

Sessões
Intervalo quinzenal

Sofiderm
Derm Sub-Skin

10mL por lado

20mL por sessão

2 Sessões
Intervalo quinzenal

Sofiderm
Derm Sub-Skin


10mL por lado em cada sessão

2ª sessão mais localizada
Menos produto

1. de MATOS LOURENÇO ET AL. Skin Health Dis. 2023;e290. 2. LOURENÇO et al. J Cosmet Dermatol. 2022;21:1967-1972.


PROTOCOLO FALOPLASTIA 6S (Preenchimento íntimo masculino)

Dr. Renan Boeira e Dr Gabriel de Camargos



PROTOCOLO GROWTH CHEST (Preenchimento peitoral)


Dra. Luciana Lourenço



PROTOCOLO ABDOMEN DEFINITION

(Preenchimento e definição de gominhos)

Dra. Calu Franco



PROTOCOLO ÍNTIMO FEMININO (Preenchimento da região íntima)




BOTÃO ANESTÉSICO



APLICAÇÃO EM PLANO SUBCUTÂNEO



CÂNULA 18X70 OU 22X70




0,5ML POR BRAÇO
1ML POR LADO
2ML TOTAL



SESSÃO ÚNICA




MASSAGEM LEVE




PROTOCOLO FULL CONTOUR (Aumento potencializado de glúteos)

Dra. Luciana Lourenço



STEP 1


5ML EM CADA LEQUE
50ML POR NÁDEGA



BOTÃO ANESTÉSICO
E MICROBOLUS NO
TRAJETO DA
CÂNULA



APLICAÇÃO EM TECIDO
SUBCUTÂNEO MÉDIO



CÂNULA 18X100
APLICAR NA REGIÃO
MEDIAL SUPRAMUSCULAR,
E NA REGIÃO
CENTROSUPERIOR



5ML POR BRAÇO
DE LEQUE



SESSÃO ÚNICA



50ML EM
CADA NÁDEGA



STEP 2

1ML EM CADA LEQUE
10ML POR NÁDEGA



MEDICAL
BIOINSTRUMENTS

**MEDICAL
BIOINSTRUMENTS**



@bioinstrumentsmedical



www.bioinstruments.com.br



comercial@bioinstruments..com.br

ACESSE O QR CODE E SAIBA MAIS:

